

# التعّرف على أدوية مرض السكري

قد يختلف جدول تعاطي الأدوية الخاص بك عند دخولك المستشفى (أو بين البيت والمستشفى). ويتوجب عليك مراجعة جدولك المنزلي مع طبيبك بعد خروجك من المستشفى.



## الحروب

تحذّث مع طبيبك	التأثيرات الجانبية الممحتملة	طريقة تأثيره	نوع واسم الدواء
إذا كانت لديك مشاكل في الكلى، الكبد، أو الرئة، أو لديك عجز قلبي احتقاني أو ضعف في القلب.	يمكن أن يسبب الإسهال، تقلصات في المعدة وغازات	يمنع الكبد من إطلاق كميات إضافية من السكر في الدم	GLUCOPHAGE (Metformin)
إذا كانت لديك مشاكل في الكبد أو في الكلى، أو حساسية للأدوية ذات المحتوى الكبريتني (سلفـاً)	مستوى سكر منخفض في الدم، غثيان، تقيّف، وزيادة في الوزن	يحفز البنكرياس لإطلاق المزيد من الإنسولين	DIABETA (Glyburide) GLUCOTROL (Glipizide) AMARYL (Glimipride)
إذا كنت تعاني من أمراض الكبد أو الكلى	صداع، تقلصات في المعدة، إسهال أو رشح الأنف	تنع الكبد من إطلاق كميات إضافية من السكر في الدم، وترفع نسبة الإنسولين أثناء تناول الوجبات	JANUVIA (Sitagliptin) ONGLYZA (Saxagliptin) TRADJENTA (Linagliptin)
إذا كنت لديك مشاكل في الكبد أو في القلب. وقد تسبب إنفالحاً في الوجه أو في الساقين. وقد تزيد من مخاطر الإصابة بألم الصدر والسكنة القلبية	انخفاض مستوى السكر في الدم، صداع، توّرم، زيادة في الوزن، أو توّرم الكاحلين	تجعل الخلايا العضلية أكثر حساسية للإنسولين	ACTOS (Pioglitazone) AVANDIA (Rosiglitazone)
إذا كانت لديك مشاكل في الكبد أو في المعدة.	تقلصات في المعدة وإسهال.	تطيّن من عملية هضم الكاربوهيدرات.	PRECOSE (Acarbose) GLYSET (Miglitol)
إذا كانت لديك مشاكل في الكبد أو في الكلى. تجنّب أكل الكربب فروت أو شرب عصيره.	انخفاض مستوى السكر في الدم، زيادة في الوزن، أو آعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا.	ترفع من نسبة الإنسولين في الجسم.	PRANDIN (Repaglinide) STARLIX (Nateglinide)

# الإنسولين والحقن الأخرى

## الإنسولين

التعليمات	إنتهاء المفعول	أقوى تأثير له	يبدأ تأثيره	طريقة تأثيره	نوع وإسم الدواء
مظهر شفاف يؤخذ مع الوجبات	6 - 4 ساعات	2 - 1 ساعات	15 - 5 دقيقة	بلعوي سريع التأثير	APIDRA (Glulisine) HUMALOG (Lispro) NOVOLOG (Aspart)
مظهر شفاف تؤخذ قبل الوجبات بـ 30 دقيقة	6 - 8 ساعات	3 - 2 ساعات	60 - 30 دقيقة	بلعوي قصير المفعول	اعتيادي
مظهر ضبابي، يُدُور ويمزج. يؤخذ حسب التعليمات.	10 - 18 ساعة	10 - 6 ساعات	4 - 2 ساعات	أساسي متوسط المفعول	مستحلق الإنسولين المتجانس NPH
مظهر شفاف. يؤخذ نفس الوقت كل يوم. يجب عدم خلطه مع أنواع الإنسولين الأخرى.	24 ساعة تقريباً		2 - 1 ساعات	أساسي طويل المفعول	LANTUS (Glagine) LEVEMIR (Detemir)
مظهر ضبابي، يُدُور ويمزج. يؤخذ حسب التعليمات.	12 - 20 ساعة	12 - 3 ساعات	60 - 30 دقيقة	مركب مزج مسيق مع الاعتيادي	50/50 و 70/30
مظهر ضبابي، يُدُور ويمزج. يؤخذ حسب التعليمات.	12 - 20 ساعة	12 - 3 ساعات	60 - 30 دقيقة	مركب مزج مسيق مع سريع التأثير	75/25 and 70/30

## الحقن الأخرى

التأثيرات الجانبية المحتملة	طريقة تأثيره	نوع وإسم الدواء
غثيان، تقيؤ، فقدان في الشهية وامساك	يساعد في زيادة إفراز الإنسولين	BYETTA/BYDUREON (Exenatide) VICTOZA (Liraglutide)
غثيان، تقيؤ، فقدان في الشهية	يساعد في خفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبات. يستخدم مع الإنسولين أثناء تناول الوجبات	SYMLIN (Pramlintide)